

桜島の火山活動解説資料（平成 26 年 7 月）

福岡管区気象台
火山監視・情報センター
鹿児島地方気象台

昭和火口では、爆発的噴火¹⁾が 20 回発生するなど、活発な噴火活動が継続しました。

昭和火口及び南岳山頂火口から概ね 2 km の範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石²⁾及び火砕流に警戒してください。風下側では火山灰だけでなく小さな噴石（火山れき³⁾）が遠方まで風に流されて降るため注意してください。

爆発的噴火に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。また、降雨時には土石流に注意してください。

平成 24 年 3 月 21 日に火口周辺警報（噴火警戒レベル 3、入山規制）の切替を発表しました。警報事項に変更はありません。

○ 7 月の活動概況

・噴煙など表面現象の状況（表 1、図 1～3、図 5-①～③）

昭和火口では、活発な噴火活動が継続しました。噴火⁴⁾の回数は 31 回（6 月：48 回）で、このうち爆発的噴火の回数は 20 回（6 月：39 回）でした。大きな噴石が 4 合目（昭和火口より 800～1,300m）まで達する爆発的噴火は、4 回発生しました。噴煙の高さの最高は、5 日 21 時 15 分の噴火による火口縁上 2,600m でした。4 日 06 時 46 分の爆発的噴火では、ごく小規模な火砕流が発生し、昭和火口の東側へ約 600m 流下しました。

同火口では、夜間に高感度カメラで明瞭に見える火映⁵⁾を 24 日、25 日、31 日に観測しました。

南岳山頂火口では、28 日に噴煙の高さが火口縁上 200m のごく小規模な噴火が発生しました。

・地震や微動の発生状況（表 2、図 6、図 7）

火山性地震の月回数は 506 回（6 月：488 回）と少ない状態で経過しました。震源は、南岳の海拔下 2～3 km 付近でした。

噴火に伴う火山性微動の継続時間は、月合計 228 時間 1 分（6 月：212 時間 10 分）で、前月と同程度でした。

・火山ガスの状況（図 5-⑤）

8 日に実施した現地調査では、二酸化硫黄の放出量は 1 日あたり 2,000 トン（6 月：2,500 トン）と多い状態でした。

この火山活動解説資料は福岡管区気象台ホームページ（<http://www.jma-net.go.jp/fukuoka/>）や気象庁ホームページ（<http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html>）でも閲覧することができます。次回の火山活動解説資料（平成 26 年 8 月分）は平成 26 年 9 月 8 日に発表する予定です。

この資料は気象庁のほか、国土地理院、九州地方整備局大隅河川国道事務所、鹿児島県、鹿児島大学、京都大学、独立行政法人防災科学技術研究所のデータを利用して作成しました。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図 50mメッシュ（標高）』を使用しています（承認番号：平 23 情使、第 467 号）。

・地殻変動の状況（図 10～12）

桜島島内傾斜計では、2014 年 4 月頃から山体が隆起する傾向がみられていましたが、7 月中旬頃から山体が沈降する傾向となっています。

GNSS⁶⁾ 連続観測では、桜島島内の基線で、2014 年 1 月頃から伸びの傾向がみられていましたが、7 月頃から停滞しています。始良カルデラ（鹿児島湾奥部）の膨張を示す伸びの傾向は、2013 年 6 月頃から停滞していますが、長期的には膨張が進行してきています。

・降灰の状況（表 3、図 5-④、図 8、図 9）

鹿児島地方気象台では、月合計 3 g/m²（降灰日数 3 日）の降灰を観測⁷⁾ しました。

鹿児島県が実施している降灰の観測データから推定した火山灰の 6 月の総噴出量は約 30 万トン（5 月：約 20 万トン）でした。

表 1 桜島 最近 1 年間の月別噴火回数（2013 年 8 月～2014 年 7 月）

2013～2014年		8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
南岳山頂	噴火回数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	火口	爆発的噴火	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
昭和	噴火回数	144	154	127	69	40	16	33	75	29	35	48	31	801
	火口	爆発的噴火	118	110	87	50	22	14	25	60	18	18	39	20

表 2 桜島 最近 1 年間の月別地震回数と月別微動時間（赤生原：2013 年 8 月～2014 年 7 月）

2013～2014年	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
地震回数	971	794	670	453	699	296	280	425	239	175	488	506	5,996
微動時間（時間：分）	54:37	80:55	83:43	52:12	92:18	51:40	35:23	3:30	5:17	5:15	212:10	228:01	905:01

表 3 桜島 最近 1 年間の鹿児島地方気象台での月別降灰量と降灰日数（2013 年 8 月～2014 年 7 月）

2013～2014年	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	合計
降灰量（g/m ² ）	59	906	720	7	18	15	4	5	47	21	51	3	1,856
降灰日数	13	20	22	3	3	7	11	5	10	7	14	3	118

- 1) 桜島では、火道内の爆発による地震を伴い、爆発音、体を感じる空気の振動、噴石の火口外への飛散、または、気象台や島内の観測点で一定基準以上の空気の振動のいずれかを観測した場合に爆発的噴火としています。
- 2) 噴石については、その大きさによる風の影響の程度の違いによって到達範囲が大きく異なります。本文中「大きな噴石」とは「風の影響を受けず弾道を描いて飛散する大きな噴石」のことであり、「小さな噴石」とはそれより小さく「風に流されて降る小さな噴石」のことです。
- 3) 霧島山・桜島では「火山れき」の用語が地元で定着していると考えられることから、付加表現しています。
- 4) 桜島では噴火活動が活発なため、噴火のうち、爆発的な噴火もしくは噴煙量が中量以上（概ね噴煙の高さが火口縁上 1,000m 以上）の噴火の回数を計数しています。資料の噴火回数はこの回数を示します。また、基準に達しない噴火は、ごく小規模な噴火として噴火回数に含めていません。
- 5) 赤熱した溶岩や高温の火山ガス等が、噴煙や雲に映って明るく見える現象です。
- 6) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。
- 7) 鹿児島地方気象台（南岳の西南西、約 11km）における前日 09 時～当日 09 時に降った 1 m²あたりの降灰量です。




図1 桜島 4日06時46分の昭和火口の爆発的噴火の状況
（左図：早崎カメラ、右図：早崎熱カメラ、（大隅河川国道事務所設置））

ごく小規模な火砕流が発生し、昭和火口の東側へ約600m流下しました。



図2 桜島 5日21時15分の昭和火口の爆発的噴火の状況
（牛根遠望カメラ）

やや多量の噴煙が火口縁上2,600mまで上がりました。




図3 桜島 昭和火口月別噴火回数（灰色）と昭和火口月別爆発回数（赤色）
（2006年1月～2014年7月）

< 7月の状況 >

昭和火口では、活発な噴火活動が継続しました。噴火の回数は31回（6月：48回）で、そのうち爆発的噴火の回数は20回（6月：39回）でした。




図4 桜島 観測点配置図

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
（大隅）：大隅河川国道事務所設置、（国）：国土地理院、（京大）：京都大学防災研究所設置
（鹿）：鹿児島大学




図5 桜島 最近2年間の噴煙、降灰、火山ガス（2012年8月～2014年7月）

<7月の状況>

- ・昭和火口では、活発な噴火活動が継続しました。
- ・南岳山頂火口では、28日に噴煙の高さが火口縁上200mのごく小規模な噴火が発生しました。
- ・鹿児島地方気象台では、月合計3g/m²（降灰日数3日）の降灰を観測しました。
- ・二酸化硫黄の放出量は1日あたり2,000トン（6月：2,500トン）と多い状態でした。





図6 桜島 最近2年間の火山性地震、火山性微動（2012年8月～2014年7月）

< 7月の状況 >

- ・火山性地震の月回数は506回（6月：488回）と少ない状態でした。
- ・噴火に伴う火山性微動が発生しており、継続時間の月合計は228時間1分（6月：212時間10分）で、前月と同程度でした。

*2012年7月19～26日、11月18～22日は赤生原障害のため、2014年5月24日以降は赤生原周辺の工事ノイズ混入のため、あみだ川で計測（計測基準：水平動 $2.5 \mu\text{m/s}$ ）しています。

- 8) 火山性地震のうち、P波、S波の相が明瞭で比較的周期の短い地震で一般的に起こる地震と同様、地殻の破壊によって発生していると考えられ、マグマの貫入に伴う火道周辺の岩石破壊によって発生していることが知られています。
- 9) 火山性地震のうち、相が不明瞭で、比較的周期が長く、火口周辺の比較的浅い場所で発生する地震で、火道内のガスの移動やマグマの発泡などにより発生すると考えられています。



● : 2014 年 7 月の震源
 ○ : 2012 年 10 月～2014 年 6 月の震源

図 7 桜島 震源分布図（2012 年 10 月～2014 年 7 月）

< 7 月の状況 >

震源は、南岳の海拔下 2～3 km 付近でした。




図 8 桜島 鹿児島県が実施している降灰の観測データから推定した火山灰の月別総噴出量
(2006 年 1 月～2014 年 6 月)

火山灰の 2014 年 6 月の総噴出量は約 30 万トン（5 月：約 20 万トン）でした。

鹿児島県の降灰観測データをもとに鹿児島地方気象台で解析して作成。




図 9 桜島 鹿児島県が実施している降灰の観測データから推定した火山灰の年別総噴出量
(1980 年～2014 年 6 月)

鹿児島県の降灰観測データをもとに鹿児島地方気象台で解析して作成。



図 10 桜島 島内傾斜計の変化（2009 年 1 月～2014 年 7 月）
(下図：有村観測坑道の水管傾斜計（大隅河川国道事務所設置）)

桜島島内傾斜計では、2014 年 4 月頃から山体が隆起する傾向がみられていましたが、7 月頃から山体が沈降する傾向となっています。

*有村観測坑道は 0.0055 μ rad/day のトレンド補正を行っている




図 11-1 桜島 GNSS 連続観測による基線長変化 (2010 年 10 月～2014 年 7 月)

GNSS 連続観測では、桜島島内の基線で、2014 年 1 月頃から伸びの傾向がみられていましたが、7 月頃から停滞しています。始良カルデラ (鹿児島湾奥部) の膨張を示す伸びの傾向は、2013 年 6 月頃から停滞していますが、長期的には膨張が進行してきています。

桜島島内及び始良カルデラ周辺の気象庁・国土地理院の 9 観測点の基線による観測を行っています。この基線は図 12 の①～⑥に対応しています。灰色の部分は機器障害のため欠測を示しています。




図 11-2 桜島 GNSS 連続観測による基線長変化 (2010 年 10 月～2014 年 7 月)

桜島島内及び始良カルデラ周辺の気象庁・国土地理院の 9 観測点の基線による観測を行っています。
この基線は図 12 の⑦～⑫に対応しています。
灰色の部分は機器障害のため欠測を示しています。




図 12 桜島 GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
 （国）：国土地理院