

雌阿寒岳の火山活動解説資料（平成30年4月）

札幌管区気象台
地域火山監視・警報センター

火山活動は概ね静穏に経過しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められません。
噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・噴煙などの表面現象の状況（図1-①～⑥、図3、図4-①）

ポンマチネシリ96-1火口の噴煙及びその他の火口の噴気の高さは火口縁上概ね100m以下で、噴煙及び噴気活動は低調に経過しました。

・地震及び微動の発生状況（図1-⑦～⑧、図5～7）

今期間の地震は、ポンマチネシリ火口付近の浅い所（海拔0km以浅）及び中マチネシリ火口付近や東山腹のやや深い所（海拔下0～1km）で発生しました。地震回数は少なく、地震活動は低調に経過しました。なお、21日14時13分に雌阿寒岳の東方約5km（フレベツ岳付近）で地震が発生し、釧路市阿寒町阿寒湖温泉で震度1を観測しました。この地震の発生前後で雌阿寒岳の噴気の状況や地殻変動に変化はありませんでした。

2015年以降、中マチネシリ火口付近及び東山腹の地震は消長を繰り返しながらやや多い状態にあります。

火山性微動は観測されませんでした。

・ポンマチネシリ96-1火口周辺の全磁力の状況（図4-②）

ポンマチネシリ96-1火口南側で実施している全磁力連続観測¹⁾によると、2015年3月中旬から2016年4月に観測された、ポンマチネシリ96-1火口近傍の地下における熱活動の活発化の可能性を示す全磁力の減少傾向は、2016年10月以降やや増加傾向に転じています。

・地殻変動の状況（図8）

GNSS²⁾ 連続観測では、2016年10月下旬以降、雌阿寒岳の北東側に膨張源が推定される地殻変動が観測されており、2017年5月以降は小さくなりましたが、わずかに継続しています。

- 1) 火口の南側で全磁力を観測した場合、全磁力値が減少すると火山体内部で温度上昇が、全磁力値が増加すると火山体内部で温度低下が生じていると推定されます。
- 2) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。
- 3) 赤外放射温度計や赤外熱映像装置は、物体が放射する赤外線を検知して温度や温度分布を測定する計器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で熱源の温度よりも低く測定される場合があります。

この火山活動解説資料は、札幌管区気象台のホームページ(<https://www.jma-net.go.jp/sapporo/>)や気象庁のホームページ(https://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php)でも閲覧することができます。

この資料は気象庁のほか、北海道大学、北海道及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所、国立研究開発法人防災科学技術研究所及び公益財団法人地震予知総合研究振興会のデータを利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図10mメッシュ（火山標高）』及び『数値地図50mメッシュ（標高）』を使用しています（承認番号 平29情使、第798号）。

次回の火山活動解説資料（平成30年5月分）は平成30年6月8日に発表する予定です。




図1 雌阿寒岳 火山活動経過図（1973年1月～2018年4月）

⑥：グラフの灰色部分は機器障害による欠測期間を示します。

* 1：2012年から分解能が高い測定機器に変更したため、同じ対象を観測した場合でもそれ以前の機器より高めの温度が観測される傾向があります。




図2 雌阿寒岳 火口周辺図




図3 雌阿寒岳 南東側から見た山体の状況
（4月19日、上徹別監視カメラによる）




図 4 雌阿寒岳 噴煙の長さと全磁力の比較及び全磁力観測点配置図

①気温補正したポンマチネシリ96-1火口の噴煙の長さ（2003年 1 月 1 日～2018年 4 月30日）

②ポンマチ南東観測点（観測点配置図◎）の全磁力値変化（2003年10月16日～2018年 5 月 1 日）

* ①について

噴煙の長さは火山活動以外にも気温が低い時に長く見える、気温が高い時に短く見えるなど気温の影響を受けて変動します。グラフは補正式を用いて気温の影響を小さくした噴煙の長さを示しています。

* ②について

グラフで示した全磁力値は、ポンマチ南東観測点と女満別観測施設との全磁力差を示します。空白部分は欠測期間を示します。

2012年 1 月頃の破線円内の変動は、活発な太陽活動による磁気嵐の影響と考えられます。




図5 雌阿寒岳 火山性地震の日回数及び積算回数推移（2003年1月～2018年4月）

上：雌阿寒岳における地震回数（図6の全領域）

下：中マチネシリ火口付近及び東山腹の地震回数（図6の点線内の領域）

▲はごく小規模な水蒸気噴火の発生時期を示します。

- ・中マチネシリ火口付近及び東山腹などの山体東側での地震は、2015年以降消長を繰り返しながらもやや多い状態にあります。




図6 雌阿寒岳 火山性地震の震源分布（2012年1月～2018年4月）

●印：2012年1月～2018年3月の震源 ●印：2018年4月の震源

+印：地震観測点

図5で説明している中マチネシリ火口付近及び東山腹の地震は点線内の地震を指します。

- ・地震は、ポンマチネシリ火口付近の浅い所（海拔0km以浅）及び中マチネシリ火口付近と東山腹のやや深い所（海拔下0～1km）で発生しました。





図 7 雌阿寒岳 広域地震観測網による山体周辺の地震活動
 (1997年10月1日～2018年4月30日、マグニチュード0以上、深さ10km以浅)
 ・21日に阿寒湖温泉で震度1を観測した地震は、雌阿寒岳の東方約5kmで発生しました。



2013 年 10 月までの観測点配置図

2013 年 10 月からの観測点配置図




図 8 雌阿寒岳 GNSS連続観測による基線長変化（2006年 4 月～2018年 4 月）及び観測点配置図

基線①～④は観測点配置図の①～④に対応しています。

基線図中の▲は2006年 3 月及び2008年11月の噴火を示します。

基線の空白部分は欠測を示します。

点線内の変動は、凍上や積雪の影響による変化を示します。

- ・ 基線②、④で2016年10月下旬から伸びが観測されています。2017年 5 月以降は伸びが小さくなりましたが、わずかに継続しています（青矢印）。




図9 雌阿寒岳 観測点配置図

各機器の配置図は、広域図内の□で示した領域を拡大したものです。

＋印は観測点の位置を示します。

気象庁以外の機関の観測点には以下の記号を付しています。

(北) : 北海道大学

(道) : 北海道

(道地) : 地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所