

## 霧島山の火山活動解説資料（令和 7 年 4 月）

福岡管区气象台

地域火山監視・警報センター

鹿児島地方气象台

### えびの高原（硫黄山）周辺

硫黄山では、活発な噴気活動が続いています。硫黄山付近の浅いところを震源とする火山性地震は少ない状態で経過しています。

硫黄山では、現時点では噴火の兆候は認められませんが、活火山であることから、現在活発な噴気活動がみられている硫黄山火口内、及び硫黄山の西側 500m の噴気地帯から概ね 100m の範囲では、熱水・熱泥等が飛散する可能性がありますので注意してください。また、火山ガスにも注意が必要です。

地元自治体等が行う立ち入り規制に従うとともに、火口周辺や噴気孔の近くにはとどまらないでください。

噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

### ○ 活動概況

#### ・噴気など表面現象の状況（図 1、図 2-①②）

監視カメラによる観測では、硫黄山の南側の噴気地帯で噴気が最高で 400m 以上に上がるなど、活発な噴気活動が続いています。同噴気地帯では、噴気孔からの熱水の流出は確認されず、地熱域の分布にも特段の変化は認められませんでした。硫黄山の西側 500m 付近の噴気地帯では、噴気は観測されませんでした。

#### ・地震や微動の発生状況（図 2-③④⑤、図 3）

硫黄山付近の浅いところを震源とする火山性地震の月回数は 36 回と少ない状態で経過しています（3 月：26 回）。火山性微動は 2023 年 7 月 8 日以降観測されていません。

えびの高原周辺（韓国岳～韓国岳北東側周辺及び大浪池周辺）では、火山性地震の月回数は 46 回で、前月（3 月：32 回）と同程度でした。

震源の求まった火山性地震は、主に韓国岳付近の深さ 1～3 km 付近、韓国岳の北東側約 3 km の深さ 2～4 km 付近、大浪池付近の深さ 3～4 km 付近、甕岳付近の深さ 2 km 付近に分布しました。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページでも閲覧することができます。

[https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly\\_v-act\\_doc/monthly\\_vact.php](https://www.data.jma.go.jp/vois/data/report/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php)

次回の火山活動解説資料（令和 7 年 5 月分）は令和 7 年 6 月 9 日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/kazan/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土地理院、東京大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人防災科学技術研究所、宮崎県及び鹿児島県のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図 50m メッシュ（標高）』及び『電子地形図（タイル）』を使用しています。

・地殻変動の状況（図2-⑥、図4、図5）

GNSS 連続観測では、硫黄山近傍の基線において、2023 年 5 月頃から硫黄山の山体浅部における膨張を示すと考えられるわずかな伸びがみられていましたが、同年 11 月頃から停滞しています。

・全磁力変化の状況（図6）

全磁力観測では、観測を開始した 2016 年 2 月以降、硫黄山北側の観測点で全磁力の増加、南側の観測点で全磁力の減少といった、硫黄山周辺の地下での熱の高まりを示す変化が観測されています。



図 1-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山付近の状況  
（4 月 20 日、えびの高原監視カメラ）

硫黄山の南側の噴気地帯では、噴気が最高で 400m 以上に上がるなど、活発な噴気活動が続いています。




図 1-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 硫黄山南側の状況（4 月 18 日、硫黄山南監視カメラ）

硫黄山の南側の噴気地帯では、噴気孔からの熱水の流出は確認されず、地熱域の分布にも特段の変化は認められませんでした。




図2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 火山活動経過図（2022年1月～2025年4月）

#### < 4月の状況 >

- ・監視カメラによる観測では、硫黄山の南側の噴気地帯で噴気が最高で400m以上に上がるなど、活発な噴気活動が続いています。硫黄山の西側500m付近の噴気地帯では、噴気は観測されませんでした。
- ・硫黄山付近の浅いところを震源とする火山性地震の月回数は36回と、少ない状態で経過しています（3月：26回）。
- ・えびの高原周辺（韓国岳～韓国岳北東側周辺及び大浪池周辺）では、火山性地震の月回数は46回で、前月（3月：32回）と同程度でした。
- ・火山性微動は2023年7月8日以降観測されていません。
- ・GNSS連続観測では、硫黄山近傍の基線において、2023年5月頃から硫黄山の山体浅部における膨張を示すと考えられるわずかな伸びがみられていましたが（赤矢印）、同年11月頃から停滞しています（青矢印）。

⑥の基線は図5の①に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

⑥の緑色破線内の変化は地面の凍上の影響、橙色破線内の変化は台風等の気象要因によるものと考えられます。




図 3 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 震源分布図（2017 年 1 月～2025 年 4 月）

< 4 月の状況 >

震源の求まった火山性地震は、主に韓国岳付近の深さ 1 ～ 3 km 付近、韓国岳の北東側約 3 km の深さ 2 ～ 4 km 付近、大浪池付近の深さ 3 ～ 4 km 付近、甕岳付近の深さ 2 km 付近に分布しました。

※2018 年 10 月は、観測点の障害により、硫黄山近傍で震源が求まらなかった期間があります。




図4 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） GNSS 連続観測による基線長変化（2018年3月～2025年4月）

GNSS 連続観測では、硫黄山近傍の基線において、2023年5月頃から硫黄山の山体浅部における膨張を示すと考えられるわずかな伸びがみられていましたが（赤矢印）、同年11月頃から停滞しています（青矢印）。

これらの基線は図5の①～⑤に対応しています。

直近のデータは白丸で示しています。基線の空白部分は欠測を示しています。

緑色の破線内の変化は地面の凍上の影響、橙色の破線内の変化は台風等の気象要因の影響と考えられます。

②③⑤の基線において2021年1月及び同年12月頃から2022年3月頃にかけて認められる変化（緑矢印）は、硫黄山南西観測点の局所的な変動によるものと考えられます。

図上部の黒三角及び橙破線は、2018年4月19日及び26日の噴火の発生を示しています。




図5 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 図2及び図4のGNSS 連続観測点と基線番号

白丸（○）は気象庁の観測点位置を示しています。




図 6-1 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点配置図

2016 年 2 月の観測開始以降の各観測点の全磁力の変化傾向（図 6-2 の変化傾向）を「■（増加傾向）」「■（減少傾向）」「■（傾向なし、またはデータ不足等により傾向不明）」でそれぞれ示しています。



図 6-2 霧島山（えびの高原（硫黄山）周辺） 全磁力観測点で観測された全磁力変動  
（2016 年 1 月～2025 年 4 月）

観測開始（2016 年 2 月）以降、硫黄山の北側の観測点で全磁力の増加（赤矢印）、南側の観測点では全磁力の減少（青矢印）といった、硫黄山周辺の地下での熱の高まりを示す変化が観測されています。

各観測点と地磁気観測所鹿屋観測施設（硫黄山の南約 60km）の全磁力差分値のうち、電離層の影響が小さくなる夜間の平均値（00:00～02:59（JST））を求め、日値としてプロットしています。

図上部の黒三角及び橙破線は、2018 年 4 月 19 日及び 26 日の噴火の発生を示しています。

空白部分は欠測を示しています。

硫黄山北東 2 観測点で 2025 年 1 月頃から 3 月頃にみられる変動（緑色の破線内）は、観測点近傍での掘削工事によるものと考えられます。

## 【参考】全磁力観測について

火山活動が静穏なときの火山体は地球の磁場（地磁気）の方向と同じ向きに磁化されています。これは、火山を構成する岩石には磁化しやすい鉱物が含まれており、マグマや火山ガス等に熱せられていた山体が冷えていく過程で、地磁気の方に帯磁するためです。しかし、火山活動の活発化に伴い、マグマが地表へ近づくなどの原因で火山体内の温度が上昇するにつれて、周辺の岩石が磁力を失うようになります。これを「熱消磁」と言います。そして地下で熱消磁が発生すると、地表で観測される磁場の強さ（全磁力）が変化します。これらのことから、全磁力観測により火山体内部の温度の様子を知る手がかりを得ることができます。

例えば、火口直下で熱消磁が起きたとすると、火口の南側では全磁力の減少、火口北側では逆に全磁力の増大が観測されます。この変化は、熱消磁された部分に地磁気と逆向きの磁化が生じたと考えることで説明できます。火口周辺で観測した全磁力の値は、南側Aでは地磁気と逆向きの磁力線に弱められて小さく、北側Bでは強められて大きくなるのがわかります（図6-3）。

ただし全磁力の変化は、熱消磁によるものだけでなく、地下の圧力変化などによっても生じることがあります。




図 6-3 熱消磁に伴う全磁力変化のモデル

火山体周辺の全磁力変化と火山体内部の温度

| 観測点の全磁力変化                      | 地下の岩石の磁化 | 火山体内の温度変化 |
|--------------------------------|----------|-----------|
| 北側で <b>増加</b><br>南側で <b>減少</b> | 消磁       | 上昇        |
| 北側で <b>減少</b><br>南側で <b>増加</b> | 帯磁       | 低下        |

## 大幡池

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

活火山であることから、規模の小さな噴出現象が突発的に発生する可能性がありますので、留意してください。

噴火予報（噴火警戒レベル 1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

### ○ 活動概況

#### ・ 噴煙など表面現象の状況（図 1、図 2-①）

監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。

#### ・ 地震や微動の発生状況（図 2-②、図 3）

火山性地震の月回数は 13 回で、前月（3 月：25 回）と比較して減少しました。

震源の求まった火山性地震は、大幡池の西側 1 km 付近の深さ 3 ～ 4 km 付近に分布しました。

火山性微動は観測されませんでした。

#### ・ 地殻変動の状況（図 4、図 5）

GNSS 連続観測では、一部の基線で 2025 年 1 月頃から新燃岳付近の地下の膨張によると考えられるわずかな変化がみられています。



図 1 霧島山（大幡池） 大幡池及び大幡山の状況（4 月 19 日、八久保監視カメラ）

監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。




図2 霧島山（大幡池） 火山活動経過図（2017年1月～2025年4月）

< 4月の状況 >

- ・監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。
- ・火山性地震の月回数は13回で、前月（3月：25回）と比較して減少しました。

大幡池付近の火山性地震の回数について、2020年12月31日までは「新燃岳南西観測点（計数基準 水平動： $2.0 \mu\text{m/s}$ ）」で計数していましたが、大幡池付近の地震活動をより正確に捉えるため、2021年1月から「大幡山登山口観測点（計数基準：南北成分： $6.0 \mu\text{m/s}$ ）」で計数しています。




図3 霧島山（大幡池） 震源分布図（2017年1月～2025年4月）

< 4月の状況 >

震源の求まった火山性地震は、大幡池の西側1km付近の深さ3～4km付近に分布しました。

霧島山（大幡池）の火山活動については、主に大幡池及び大幡山付近（青破線内）の地震活動に注目して監視しています。大幡池及び大幡山付近では、新燃岳の火山活動が活発であった2018年3月から7月にかけて火山性地震の増加がみられたことがあります。

大幡池の北西側の地震（黒破線内）は、えびの高原周辺の地震として計数しています。




図4 霧島山（大幡池） GNSS 連続観測による基線長変化（2017年1月～2025年4月）

GNSS 連続観測では、一部の基線で 2025 年 1 月頃から新燃岳付近の地下の膨張によると考えられるわずかな変化がみられています（赤矢印）。

これらの基線は図5の①～④に対応しています。


直近のデータは白丸で示しています。基線の空白部分は欠測を示しています。

青色の破線内の変化は、霧島山夷守台(防)観測点の局所的な変化に伴うものと考えられます。

紫色の破線内の変化は、韓国岳観測点の局所的な変化に伴うものと考えられます。

橙色の破線内の変化は、2024 年 8 月 8 日の日向灘の地震による変動です。

（防）：防災科学技術研究所



小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。

（防）：防災科学技術研究所

図5 霧島山（大幡池） GNSS 連続観測点と基線番号

## 新燃岳

新燃岳では、3 月 30 日（期間外）に火山性地震の増加とともに山体の膨張を示す地殻変動がみられたことから、火山活動が高まっていると判断し、噴火警戒レベルを 3 に引き上げ、警戒が必要な範囲を火口から概ね 4 km に拡大しました。その後、地震回数は減少し、さらなる山体の膨張を示す地殻変動も認められないことから、2 日に火口周辺警報を発表し、噴火警戒レベル 3（入山規制）を切り替え、警戒が必要な範囲を概ね 4 km から概ね 3 km に縮小しました。

その後も火山性地震は増減を繰り返しています。新燃岳周辺の複数の傾斜計では、22 日から 26 日にかけて北西上がりの緩やかな傾斜変動が観測され、地震回数も一段と増加しました。さらに、27 日には継続時間の長い火山性微動も発生しました。また、30 日には新燃岳西側斜面の割れ目付近から白色の噴気を観測しました。

新燃岳では火山活動が高まっており、弾道を描いて飛散する大きな噴石が新燃岳火口から概ね 3 km まで、火砕流が概ね 2 km まで達する可能性があります。そのため、新燃岳火口から概ね 3 km の範囲では警戒してください。風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るおそれがあるため注意してください。2011 年と同様の爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。

地元自治体等の指示に従って危険な地域には立ち入らないでください。

## ○ 活動概況

### ・噴煙など表面現象の状況（図 1、図 2、図 3、図 7-①②③）

新燃岳火口では、噴煙の高さは火口縁上 400m 以下で経過しました。大浪池監視カメラ（鹿児島県設置）による観測では、30 日に一時的に新燃岳西側斜面の割れ目からの噴気を観測しました。この領域で噴気が確認されたのは、2024 年 12 月 14 日以来です。

8 日、24 日及び 30 日に新湯温泉付近から実施した現地調査では、2018 年噴火で流下した溶岩の上部及び新燃岳西側斜面の割れ目付近でわずかな地熱域を確認しました。新燃岳西側斜面の割れ目付近からの噴気は認められませんでした。

### ・地震や微動の発生状況（図 4、図 5、図 6、図 7-④⑤、図 8）

新燃岳では、2024 年 10 月下旬頃から火口直下を震源とする火山性地震が増減を繰り返しています。その増分は次第に大きくなる傾向があり、25 日には前 24 時間の地震回数が 500 回を超えました。火山性地震の月回数は 2,442 回で、前月（3 月：1,092 回）と比較して増加しました。27 日には継続時間の長い火山性微動が発生しました。

震源が求まった火山性地震は、新燃岳火口直下の深さ 0 ～ 2 km 付近及び新燃岳西側の深さ 2 ～ 4 km 付近に分布しました。

### ・火山ガスの状況（図 7-③）

8 日に山麓で実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は、検出限界未満でした（前回 2025 年 1 月 30 日：検出限界未満）。

・地殻変動の状況（図 7-⑥、図 9、図 10、図 11）

GNSS 連続観測では、2024 年 11 月頃から、霧島山を挟む一部の基線で新燃岳付近の地下の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められます。霧島山深部の膨張を示す変化は認められません。

新燃岳周辺の複数の傾斜計では、22 日から 26 日にかけて北西上がりの緩やかな傾斜変動が観測されました。



図 1 霧島山（新燃岳） 30 日の新燃岳西側斜面の割れ目及び新燃岳火口内の噴気の状況  
（左図：新湯林道監視カメラ、右図：大浪池監視カメラ（鹿児島県設置））

- ・新燃岳西側斜面の割れ目で、高さ 10m の噴気を観測しました（黄矢印）。
- ・新燃岳火口内における白色噴煙の状況に特段の変化は認められません。




図2 霧島山（新燃岳） 新燃岳南西側の状況（新湯温泉付近からの観測）

- ・ 8 日、24 日及び 30 日に新湯温泉付近から実施した現地調査では、2018 年噴火で流下した溶岩の上部及び新燃岳西側斜面割れ目付近でわずかな地熱域を引き続き確認しました。
- ・ 2018 年噴火で流下した溶岩の上部において高さ約 10m の弱い噴気が上がっていることを確認しました。
- ・ 新燃岳西側斜面割れ目付近からの噴気は認められませんでした。



図 3 霧島山（新燃岳） 図 2 の観測位置及び撮影方向




図 4 霧島山（新燃岳） 火山性地震の時間別回数及び前 24 時間積算回数（赤線）  
（2025 年 3 月 29 日（期間外）～ 4 月 30 日）

新燃岳の火口直下を震源とする火山性地震は増減を繰り返しています。噴火警戒レベルを 3 に引き上げた 3 月 30 日以降も間欠的に回数の増加がみられ、その増分は次第に大きくなる傾向があります。25 日には前 24 時間の地震回数が 500 回を超えました。




図5 霧島山（新燃岳） 27日に発生した火山性微動の状況（27日22時00分から1時間表示）  
（新燃西（震）地震計：速度波形上下動成分）

27日夕方から28日00時頃にかけて火山性微動が観測されました。




図6 霧島山（新燃岳） 27日の火山性微動発生前後の新燃西（震）地震計の振幅の状況  
（2025年4月27日10時00分～4月28日10時00分）

- ・新燃岳近傍の地震計では、27日夕方から28日00時頃にかけて火山性微動の発生にともなう振幅の増大がみられました。
- ・監視カメラによる観測では、振幅の増大した期間において地表面の状況に特段の異常は認められませんでした。




図7 霧島山（新燃岳） 火山活動経過図（2022年1月～2025年4月30日）

#### < 4月の状況 >

- ・新燃岳火口では、噴煙の高さは火口縁上 400m以下で経過しました。新燃岳西側斜面の割れ目では、30日に一時的に噴気を観測しました。
- ・8日に実施したガス観測では、火山ガス（二酸化硫黄）は検知されませんでした。
- ・新燃岳では、2024年10月下旬頃から火口直下を震源とする火山性地震が増減を繰り返しています。その増分は次第に大きくなる傾向があり、25日には前24時間の地震回数が500回を超えました。新燃岳付近の火山性地震の月回数は2,442回で、前月（3月：1,092回）と比較して増加しました。27日には継続時間の長い火山性微動が発生しました。
- ・GNSS連続観測では、霧島山深部の膨張を示す変化は認められません。

④の灰色の期間は、新燃西（震）観測点のデータが欠測となっている期間です。

④の青色の領域は、新燃西（震）観測点での計数基準未満のため振幅を検測していない領域です。

⑥の基線は図11の基線⑦に対応しています。

⑥の橙色破線内の変化は、日向灘の地震（2024年8月8日、2025年1月13日）による変動です。

⑥の2025年3月中旬以降のデータは速報的な解析結果であり、再解析により修正されることがあります。

※新燃岳南西観測点の機器障害により、新燃西（震）観測点、霧島南（震）観測点及び高千穂河原観測点で計数している期間があります。2024年8月16日からは新燃西（震）観測点南北動成分の3.0  $\mu\text{m/s}$  を計数基準としています。




図 8 霧島山（新燃岳） 震源分布図（2017 年 1 月～2025 年 4 月）

< 4 月の状況 >

震源が求まった火山性地震は、新燃岳火口直下の深さ 0 ～ 2 km 付近及び新燃岳西側約 1 ～ 2 km の深さ 1 ～ 4 km 付近に分布しました。

※観測点の障害により、震源が求まらなかった期間があります。




図 9 霧島山（新燃岳） 傾斜計による地殻変動の状況（分値）

（3 月 29 日（期間外）～ 4 月 30 日）

新燃岳周辺の複数の傾斜計では、22 日から 26 日にかけて北西上がりの緩やかな傾斜変動が観測されました（赤矢印）。

緑色破線内は 3 月 30 日にみられた山体の膨張を示す地殻変動です。

橙色破線内の変化は遠地地震による変動です。

各観測点の成分名に付記された「補」の文字は、そのデータが潮汐補正済みであることを示しています。




図10 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測による基線長変化（2017年1月～2025年4月）

GNSS 連続観測では、2024年11月頃から、霧島山を挟む一部の基線で新燃岳付近の地下の膨張を示すと考えられるわずかな伸びが認められます（赤矢印）。

これらの基線は図11の①～⑥に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。

緑色破線内の変化は、新床観測点周囲の環境の変化に伴う影響と考えられます。

水色破線内の変化は、新床観測点のセンサー台交換による局所的な変動による影響と考えられます。

橙色破線内の変化は、2024年8月8日の日向灘の地震による変動です。

2025年4月中旬以降のデータは速報的な解析結果であり、再解析により修正されることがあります。




図 11 霧島山（新燃岳） GNSS 連続観測点と基線番号

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
（国）：国土地理院

## 御 鉢

火山活動に特段の変化はなく、噴火の兆候は認められません。

活火山であることから、火口内でごく少量の火山灰等を噴出する規模の小さな現象が突発的に発生する可能性がありますので注意してください。

地元自治体等が行う立入規制等に留意してください。

噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

### ○ 活動概況

#### ・ 噴煙など表面現象の状況（図1、図3-①）

監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。

#### ・ 地震や微動の発生状況（図2、図3-②～⑤）

火山性地震は観測されませんでした（3月：なし）。

火山性微動は2018年2月10日以降、観測されていません。

#### ・ 地殻変動の状況（図4、図5）

GNSS連続観測では、御鉢を挟む基線には、特段の変化は認められません。



図1 霧島山（御鉢） 御鉢の状況（4月27日、猪子石監視カメラ）  
監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。




図2 霧島山（御鉢） 震源分布図（2017 年 1 月～2025 年 4 月）

< 4 月の状況 >

火山性地震は観測されませんでした。




図3 霧島山（御鉢） 火山活動経過図（2003年1月～2025年4月）

< 4月の状況 >

- ・ 監視カメラによる観測では、噴煙は認められませんでした。
- ・ 火山性地震は観測されませんでした（3月：なし）。
- ・ 火山性微動は2018年2月10日以降、観測されていません。

＊「高千穂峰2観測点、高千穂西（震）観測点及び高千穂河原観測点」で計数

（計数基準 高千穂峰2：上下動2.0  $\mu\text{m/s}$  以上、高千穂西（震）：水平動東西成分または上下動1.3  $\mu\text{m/s}$  以上、高千穂河原：水平動南北成分または上下動1.0  $\mu\text{m/s}$  以上）

2022年8月21日から11月17日まで、及び2023年8月24日以降高千穂峰2観測点は障害のため、高千穂河原観測点で計数しています。




図4 霧島山（御鉢） GNSS 連続観測による基線長変化（2017年1月～2025年4月）

GNSS 連続観測では、御鉢を挟む基線には、特段の変化は認められません。

これらの基線は図5の①～③に対応しています。

基線の空白部分は欠測を示しています。





図5 霧島山（御鉢） GNSS 連続観測点と基線番号



霧島山 観測点配置図

小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。  
（国）：国土地理院、（震）：東京大学地震研究所、（九）：九州大学、（鹿大）：鹿児島大学、  
（防）：防災科学技術研究所、（宮）：宮崎県、（鹿）：鹿児島県