

雌阿寒岳の火山活動解説資料（平成29年7月）

札幌管区気象台
地域火山監視・警報センター

火山活動は概ね静穏に経過しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火の兆候は認められません。
一方、ここ数年、地震増加、地殻変動、山体浅部の熱活動の活発化を示す 96-1 火口の噴煙量増加や全磁力の変化などがみられています。今後の火山活動の推移に留意してください。
噴火予報（噴火警戒レベル1、活火山であることに留意）の予報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴煙などの表面現象の状況（図1-①～⑥、図2～図6、図7-①）

14日に上空からの観測（国土交通省北海道開発局の協力による）を実施しました。赤外熱映像装置¹⁾による観測では、6月の現地調査と同様にポンマチネシリ第4火口の地熱域は引き続き認められませんでした。その他の火口の状況についても特段の変化はみられませんでした。

ポンマチネシリ96-1火口の噴煙及びその他の火口の噴気の高さは火口縁上概ね100m以下で、噴煙及び噴気活動は低調に経過しました。

・ 地震及び微動の発生状況（図1-⑦～⑧、図8～9）

火山性地震は少なく、地震活動は低調に経過しました。地震はポンマチネシリ火口付近及び中マチネシリ火口付近の浅い所で発生しました。

中マチネシリ火口付近及び東山腹の地震は2016年12月頃からやや増えた状態でしたが、2017年6月以降は増加する前と同様、少ない状態で経過しています。

火山性微動は観測されませんでした。

・ ポンマチネシリ96-1火口周辺の全磁力の状況（図7-②～③）

ポンマチネシリ96-1火口南側で実施している全磁力連続観測²⁾によると、2015年3月中旬から2016年4月にみられた、ポンマチネシリ96-1火口近傍の地下における熱活動の活発化の可能性を示す全磁力の減少傾向は、2016年10月以降やや増加傾向に転じています。

・ 地殻変動の状況（図10）

GNSS³⁾ 連続観測では、2016年10月下旬から雌阿寒岳の山体から東方にかけて膨張性の地殻変動が観測されていましたが、2017年5月以降は停滞しています。

- 1) 赤外放射温度計や赤外熱映像装置は、物体が放射する赤外線を検知して温度や温度分布を測定する計器で、熱源から離れた場所から測定できる利点がありますが、測定距離や大気等の影響で熱源の温度よりも低く測定される場合があります。
- 2) 火山体の南側で全磁力を観測した場合、全磁力値が減少すると火山体内部で温度上昇が、全磁力値が増加すると火山体内部で温度低下が生じていると推定されます。
- 3) GNSS (Global Navigation Satellite Systems) とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般を示す呼称です。

この火山活動解説資料は札幌管区気象台のホームページ(<http://www.jma-net.go.jp/sapporo/>)や気象庁のホームページ(<http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/volcano.html>)でも閲覧することができます。

この資料は気象庁のほか、北海道大学、北海道及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の『数値地図10mメッシュ（火山標高）』及び『数値地図50mメッシュ（標高）』を使用しています（承認番号 平26情使、第578号）。また、同院発行の『電子地形図（タイル）』を複製しています（承認番号 平26情複、第658号）。

次回の火山活動解説資料（平成29年8月分）は平成29年9月8日に発表する予定です。




図1 雌阿寒岳 火山活動経過図（1973年1月～2017年7月）

⑥：グラフの灰色部分は機器障害による欠測期間を示します

* 1：2012年から分解能が高い測定機器に変更したため、同じ対象を観測した場合でも
これまでの機器より高めの温度が観測される傾向があります



図 2 雌阿寒岳 南東側から見た山体の状況
かみてしべつ
（7月26日、上徹別監視カメラによる）




図 3 雌阿寒岳 周辺図（左）と火口周辺図（右）、写真の撮影方向（矢印）



図 4 雌阿寒岳 全景
図 3 の①から撮影




図 5 雌阿寒岳 ポンマチネシリ火口

上：図 3 の②から撮影 下：図 3 の③から撮影

- ・ポンマチネシリ第 4 火口（赤破線内）では地熱域は認められませんでした
- ・96-1 火口の噴煙量は 2016 年 5 月頃から減少しています。




図 6 雌阿寒岳 中マチネシリ火口の地表面温度分布 図 3 の④から撮影

- ・中マチネシリ火口の地熱域に特段の変化は認められませんでした




図 7 雌阿寒岳 浅部の火山活動の変化と全磁力観測点配置図

- ①：気温補正したポンマチネシリ96-1火口の噴煙の長さ（2003年1月1日～2017年7月31日）
- ②：ポンマチ南東観測点（観測点配置図◎）の全磁力値変化（2003年10月16日～2017年7月29日）
- ③：ポンマチ南東観測点（観測点配置図◎）の全磁力値変化（2015年8月1日～2017年7月29日）

- ・ここでの全磁力値とはポンマチ南東観測点と女満別観測施設との全磁力差を示します
- ・①に関して、通常気温が低ければ噴煙は多く見え、気温が高ければ噴煙は少なく見えますが、グラフでは補正式を用いて気温の影響を小さくした噴煙の長さを示しています
- ・②に関して、2012年1月頃の黒破線円内の変動は活発な太陽活動による磁気嵐の影響と考えられます
- ・②の空白部分は欠測期間を示します




図 8 雌阿寒岳 火山性地震の日回数及び積算回数推移（2003年1月～2017年7月）

上：全地震回数 下：中マチネシリ火口付近及び東山腹の地震回数（図9の点線内の領域）

- ・ ↑はごく小規模な水蒸気噴火の発生時期を示します
- ・ 2016年12月頃から中マチネシリ火口付近及び東山腹などの山体東側での地震がやや増加した状態でしたが、6月以降は少なく経過しています




図 9 雌阿寒岳 火山性地震の震源分布（2012年1月～2017年7月）

○印：2012年1月～2017年6月の震源

●印：2017年7月の震源

＋印：地震観測点

・ 地震は、ポンマチネシリ火口付近及び中マチネシリ火口付近の浅い所でみられています

・ 図8で説明している中マチネシリ火口付近及び東山腹の地震は点線内の地震を指します




図10 雌阿寒岳 GNSS連続観測による水平距離変化（2006年4月～2017年7月）及び観測点配置図

- ・ 基線①～④は観測点配置図の①～④に対応しています
- ・ 基線②、④で2016年10月下旬から伸びが観測されていましたが、2017年5月以降は停滞しています（青矢印）
- ・ 基線の空白部分は欠測を示します
- ・ 基線図中の↑は2006年3月及び2008年11月の噴火を示します
- ・ 基線図中の※1破線円内は、凍上や積雪の影響による変化を示します
- ・ 基線図中の※2破線円内は、雌阿寒温泉南2観測点の局所的な動きによるもので、火山活動によるものではないと考えられます




図11 雌阿寒岳 観測点配置図

各機器の配置図は、広域図内の口で示した領域を拡大したものです

+印は観測点の位置を示します

気象庁以外の機関の観測点には以下の記号を付しています

(北) : 北海道大学

(道) : 北海道

(道地) : 地方独立行政法人北海道立総合研究機構地質研究所