

硫黄島の火山活動解説資料（令和3年9月）

気象庁地震火山部
火山監視・警報センター

GNSS 連続観測によると、長期的に島全体の隆起を示す地殻変動がみられています。また、硫黄島の島内は全体的に地温が高く、多くの噴気地帯や噴気孔があり、各所で小規模な噴火が発生しています。火山活動はやや活発な状態で推移しており、火口周辺に影響を及ぼす噴火が発生すると予想されますので、従来から小規模な噴火がみられていた領域では噴火に警戒してください。

平成19年12月1日に火口周辺警報（火口周辺危険）を発表しました。また、平成24年4月27日以降の火山活動に伴い、平成24年4月29日に火山現象に関する海上警報を発表しました。その後、警報事項に変更はありません。

○ 活動概況

・ 噴気など表面現象の状況（図2、図8～11）

阿蘇台東監視カメラ（阿蘇台陥没孔^{あそだいひがし あそだいかんぼつこう}の東北東約900m）による観測では、島西部の阿蘇台陥没孔^{あそだいひがし}からの噴気の高さは100m以下で経過しました。島北西部の井戸ヶ浜^{いどがはま}からの噴気は観測されていません（図2）。

海上自衛隊硫黄島航空基地隊によると、2日、3日、17日に翁浜沖で海水が海面から10～数十m程度の高さまで噴出しているのが確認されました。

9月12日に海上保安庁が実施した上空からの観測では、島の周辺に黄緑色の変色水域が、南岸では褐色の変色水域も分布していました。また、翁浜沖の海水噴出報告位置付近において、気泡の湧出と青白色の変色水域が確認されました（図8、図9）。

8月26日（期間外）に海上保安庁が実施した上空からの観測では、馬背岩の南側及び馬背岩から北ノ鼻の海岸沿い4か所及び阿蘇台陥没孔で白色噴気が認められました。また、島の周辺に黄緑色の変色水域が認められました。翁浜沖の海水噴出報告位置付近において、青白色の変色水域と灰色の物質及び気泡の湧出が確認されました（図10、図11）。

・ 地震や微動の発生状況（図3～5）

火山性地震は概ねやや多い状態で経過しました。海水噴出の前後で単色型微動の増加が認められました。

・ 地殻変動の状況（図6、図7）

GNSS 連続観測では、長期的に島全体の隆起が継続しています。

この火山活動解説資料は気象庁ホームページ（https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/monthly_v-act_doc/monthly_vact.php）でも閲覧することができます。

次回の火山活動解説資料（令和3年10月分）は令和3年11月9日に発表する予定です。

本資料で用いる用語の解説については、「気象庁が噴火警報等で用いる用語集」を御覧ください。

<https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/kaisetsu/kazanyougo/mokuji.html>

この資料は気象庁のほか、国土地理院及び国立研究開発法人防災科学技術研究所のデータも利用して作成しています。

資料中の地図の作成に当たっては、国土地理院発行の『数値地図50mメッシュ（標高）』『2万5千分1地形図』『数値地図25000（行政界・海岸線）』を使用しています。

○ これまでの火山活動（図1）

硫黄島ではこれまでも1981年から1984年（防災科学技術研究所等の水準測量と三角測量による）や2001年から2002年に最大1mを超える隆起など顕著な地殻変動が観測されており、隆起がみられていた期間中の1982年と2001年には小規模な噴火が発生しています。

一方、噴火前に必ずしも地震活動が活発化するとは限らず、地震観測が開始された1976年以降で見ても、1982年11月の阿蘇台陥没孔や2001年9月の翁浜沖で発生した噴火、2012年4月29日から30日の島の北東沖、及び2018年9月の翁浜沖の噴火と推定される事象以外は、ほとんどの噴火で事前に地震活動の活発化が認められませんでした。




図1 硫黄島 過去に噴火等が確認された地点及びその後の状況

「鶴川元雄・藤田英輔・小林哲夫、2002、硫黄島の最近の火山活動と2001年噴火、月刊地球、号外39号、157-164。」を基に、気象庁において一部改変及び2004年以降の事象について追記



硫黄島 観測対象地点
地理院地図を使用



阿蘇台陥没孔の噴気の状態（9月2日撮影）



井戸ヶ浜の状況（9月5日撮影）

図2 硫黄島 海岸付近の噴気の状態（阿蘇台東監視カメラによる）




図3 硫黄島 硫黄島でみられる主な火山性地震、微動（調和型、単色型）の特徴と波形例




図4 硫黄島 長期火山活動経過図（2011年3月8日～2021年9月30日）

【計数基準】

2011年3月8日～12月31日：千鳥上下動振幅 $30\mu\text{m/s}$ 以上、S-P時間 2.0秒以内、あるいは
天山（防）上下動振幅 $20\mu\text{m/s}$ 以上、S-P時間 2.0秒以内

2012年1月1日～：千鳥あるいは天山（防）で上下動振幅 $30\mu\text{m/s}$ 以上、S-P時間 2.0秒以内
（防）：防災科学技術研究所

千鳥（地震計・空振計）は2018年9月22日から2019年1月28日までと、2020年9月15日から2021年8月1日まで、障害のため地震検知能力に低下がみられました。

また、2020年2月11日以降、障害のため各観測点において一部欠測の時間帯があります。

④連続的な微動とは、継続時間の長い火山性微動が観測されたことを示し、縦軸の回数とは対応していません。

- 火山性地震は概ねやや多い状態で経過しました。
- 海上自衛隊硫黄島航空基地隊によると、2日、3日、17日に翁浜沖で海水が海面から10～数十m程度の高さまで噴出しているのが確認されました（▲）。




図5 硫黄島 短期火山活動経過図（2021年8月1日～2021年9月30日）
計数基準は図4に同じ。

- ・海上自衛隊硫黄島航空基地隊によると、2日、3日、17日に翁浜沖で海水が海面から10～数十m程度の高さまで噴出しているのが確認されました（▲）。
- ・海水噴出の前後で単色型微動の増加が認められました。




図6 硫黄島 GNSS 連続観測結果（2014年3月1日～2021年9月30日）



（国）：国土地理院

グラフの空白部分は欠測

- ① 父島 A に対する硫黄島 1（島北部の元山地域）の比高の変化（図 7 の GNSS 基線 C に対応）
- ② 硫黄島 2 に対する硫黄島 1 の比高の変化（図 7 の GNSS 基線 A に対応）
- ③ 硫黄島 2 に対する M 硫黄島 A の南北の変化（図 7 の GNSS 基線 B に対応）
- ④ 硫黄島 2 に対する硫黄島 1 の南北の変化（図 7 の GNSS 基線 A に対応）

・ GNSS 連続観測によると、長期的に島全体の隆起が継続しています。

硫黄島周辺 GNSS連続観測基線図



小さな白丸（○）は気象庁、小さな黒丸（●）は気象庁以外の機関の観測点位置を示しています。
（国）：国土地理院、（防）：防災科学技術研究所

図7 硫黄島 観測点配置図

GNSS 基線は図6の基線に対応しています。



図8 硫黄島周辺の変色水域の状況
(2021年9月12日 海上保安庁撮影)
・硫黄島周囲に黄緑色の変色水域が、南岸では褐色の変色水域も分布していました。




図9 硫黄島 翁浜沖の海水噴出位置付近の状況
(2021年9月12日 海上保安庁撮影)
・気泡の湧出と青白色の変色水域が認められました。



図10 硫黄島翁浜沖の海水噴出位置付近の状況
(2021年8月26日 海上保安庁撮影)
・青白色の変色水域と灰色の物質及び気泡の湧出が認められました。




図11 硫黄島 馬背岩南部から北ノ鼻の状況（2021年8月26日 海上保安庁撮影）

- ・馬背岩南部の噴出孔Aでは湯だまりと白色噴気が認められました。噴出孔Cの周りの地表に8月16日の観測ではみられなかった白色の噴出物がみられました。（左図）
- ・馬背岩から北ノ鼻の海岸沿い4か所で白色噴気が認められました（右図）。